

Patient Blood Management Checkliste für Transfusionen bei Erwachsenen

Präoperativ

- Bei ausgewählten Risikoeingriffen, Wartezeit > 4 Tage und Transfusionswahrscheinlichkeit > 10 %:
→ präoperative Anämiediagnostik
- Blutgruppenbestimmung & Antikörpersuchtest
- Stopp Plättchenaggregationsinhibition?
- Stopp Antikoagulation?

Intraoperativ

- Restriktiver Transfusionstrigger (BÄK)
- Wärmemanagement (Normothermie)
- Gerinnungsmanagement (pH > 7,2, Ca²⁺ > 1,2)
- Blut sammeln (Cellsaver)
- Point-of-Care Diagnostik (ROTEM, Multiplate) bei diffuser Blutungsneigung
- Einsatz von Tranexamsäure/Desmopressin?
- Optimales Herzzeitvolumen?
- Normovolämie/Normoxie?
- THG: Hämokonzentration? Postfiltration?

Postoperativ

- Restriktive Blutentnahmen
- Restriktiver Transfusionstrigger (BÄK)
- Wärmemanagement (Normothermie)
- Gerinnungsmanagement (pH > 7,2, Ca²⁺ > 1,2)
- Blut sammeln (Cellsaver)
- Einsatz von Tranexamsäure/Desmopressin?
- Optimales Herzzeitvolumen?
- Normovolämie/Normoxie?