Anamnesefragen zur Ermittlung des Blutungsrisikos

Digital ausfüllen? Siehe QR-Code umseitig!

Ist bei Ihnen jemals eine **Blutgerinnungsstörung oder eine Thrombose** festgestellt worden?	☐ nein ☐ ja	▸ Diagnose erfragen	2
Sind in Ihrer Familie **Fälle von Blutungsneigungen** aufgetreten?	☐ nein ☐ ja	▸ Verwandschaftsgrad und Diagnose erfragen	2
Heilen Ihre **Wunden** schlecht ab?	☐ nein ☐ ja	▸ lange nässend, klaffend ▸ vereiternd ▸ Kelloidbildung	2 2 2

Beobachten Sie **folgende Blutungsarten**, auch ohne erkennbaren Grund?

Nasenbluten (ohne andere Ursachen wie Infekte, trockene Luft, starkes Nasenputzen etc.)	☐ nein ☐ ja	▸ immer schon ▸ saisonal ▸ HNO-Befund vorhanden ▸ bei Medikamenteneinnahme ▸ arterielle Hypertonie	2 3 1 4
Blaue Flecken oder **punktförmige Blutungen** ohne sich zu stoßen (auch am Körperrumpf)	☐ nein ☐ ja	▸ unfallträchtige Tätigkeiten ▸ immer schon ▸ bei Medikamenteneinnahme	0 2 1
Gelenk- oder **Muskel-/Weichteilblutungen**	☐ nein ☐ ja		2
Zahnfleischbluten oder Blutungen der Mundschleimhaut	☐ nein ☐ ja	▸ Parodontitis	0

Beobachten Sie **ungewöhnlich lange bzw. verstärkte Blutungen** nach Verletzungen und Eingriffen?

Blutungen nach **Schnitt- oder Schürfwunden**	☐ nein ☐ ja	▸ über 5 Minuten ▸ typische Verletzungen (Nassrasur) ▸ bei Medikamenteneinnahme	2 2 1
Blutungen während oder nach dem **Ziehen von Zähnen**	☐ nein ☐ ja	▸ über 5 Minuten ▸ Nachbehandlung nötig ▸ bei Medikamenteneinnahme	2 2 1
Blutungen während oder nach **Operationen**	☐ nein ☐ ja	▸ welche Operation? ▸ war die Blutung tatsächlich über der Norm?	5 5,2

Nehmen Sie **Medikamente** ein, **die die Blutgerinnung beeinflussen** können?

Schmerz- oder Rheumamittel (auch frei verkäufliche wie Aspirin®)	☐ nein ☐ ja	▸ Blutungsneigung seit Medikamenteneinnahme	2,4,6
Medikamente zur **Blutverdünnung**	☐ nein ☐ ja		

Zusatzfrage für Patientinnen:

Sind Ihre **Monatsblutungen** verlängert (über 7 Tage) oder verstärkt (häufiger Binden-/Tamponwechsel)?	☐ nein ☐ ja	▸ seit Menarche	2

Konsequenzen: **(0)** keine, **(1)** Medikamentenanamnese, **(2)** Konsultation Gerinnungszentrum, **(3)** Konsultation HNO Facharzt, **(4)** Konsultation Internist, **(5)** Befunderhebung, **(6)** Konsultation Internist bzw. Chirurg und evtl. Karenz

Nach Pfanner G. et al. Anaesthesist 2007, 56: 604-611